



# SYSTEME de CULTURE EXPE

à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires



Projet : DEPHY EXPE NPDC- Reconception durable de deux systèmes

grandes cultures et légumiers pour une réduction d'au moins 50 %

de l'utilisation des produits phytosanitaires

Site: Pôle Légumes
Localisation: 62840 LORGIES

(50.55469, 2.791323)

Système DEPHY: IFT 50

Contact: Samuel ALLEXANDRE (<u>samuel.allexandre@agriculture-npdc.fr</u>)



Localisation du système ( $\triangle$ ) (autre site du projet  $\triangle$ )

# Cultures légumières avec introduction de grandes cultures

Site : en station expérimentale Durée de l'essai : 2013 à 2018 Conduite : conventionnelle Circuit commercial : long

**Dispositif** expérimental : 6 parcelles de 540 m² chacune. Tous les termes de la rotation sont présents chaque année, sans répétition spatiale.

Système de référence : système IFT\* 100, conduit en parallèle selon la même rotation. Il est basé sur la conduite moyenne des agriculteurs pour chaque culture et ajusté annuellement.

(\*IFT: Indice de Fréquence de Traitements)

Type de sol : limon argilo-sableux (25 % d'argile)

# Origine du système

La rotation typique de la région est une quasi monoculture de choux fleurs (2 cultures la première année, 1 culture la seconde année), avec une diversification par du blé certaines années. Ces cultures sont conduites de façon intensive, et sont fortement consommatrices en produits phytosanitaires.

Dans le cas de cette rotation typique des légumiers, le premier levier à actionner pour permettre une réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires est l'allongement de la rotation avec une diversification des cultures. Pour une meilleure acceptabilité, il a été choisi d'introduire des cultures à haute valeur ajoutée telles que la pomme de terre et l'oignon, cultures déjà présentes dans la région.

#### Objectif de réduction d'IFT



**50 %** 

Par rapport au système de référence 'IFT 100' testé sur le site

#### Mots clés

Rotation – OAD – Biocontrôle – Variétés résistantes/tolérantes – Désherbage mécanique – Seuils BSV – Auxiliaires

# Stratégie globale



Efficience : Amélioration de l'efficacité des traitements

Substitution: Remplacement d'un ou plusieurs traitements phytosanitaires par un levier de gestion alternatif

Reconception : La cohérence d'ensemble est repensée, mobilisation de plusieurs leviers de gestion complémentaires

# Le mot du pilote de l'expérimentation

« Les leviers mis en place sont de mieux en mieux maitrisés et les résultats progressent. Changer de système suppose une phase d'apprentissage qui est à prendre en compte dans nos messages lors du transfert vers les agriculteurs. Au bout de quatre ans, les performances obtenues interpellent les agriculteurs : les conseillers spécialisés qui suivent cette expérimentation intègrent de plus en plus la démarche système dans leurs conseils. » S. ALLEXANDRE



# Caractéristiques du système

#### **Rotation:**




CIPAN : Culture Intermédiaire Piège à Nitrates ; CF : Choux Fleur (CF1 et CF2 correspondent à deux cultures de choux fleur la même année. CF1 est la culture de choux fleur de printemps et CF2 d'automne) ; Pdt : Pommes de terre

Mode d'irrigation : Rampe d'aspersion utilisée pour les cultures d'oignons, de pommes de terre et de choux fleurs.

**Travail du sol :** Passage de rotobêche en systématique avant toutes les cultures à l'exception du blé où les passages dépendent des conditions climatiques.

**Interculture :** La présence de CIPAN est obligatoire dans la région, qui est en grande partie en zone vulnérable nitrates. L'espèce choisie est l'avoine, contrairement à la pratique locale qui utilise la moutarde, afin de limiter le risque sclérotinia.

Infrastructures agro-écologiques : Présence de bandes enherbées autour des parcelles.



Pour chaque terme de la rotation, la parcelle de gauche représente le système de référence 'IFT 100', et celle de droite le système économe en produits phytosanitaires 'IFT 50'.

# Objectifs du système

Les objectifs poursuivis par ce système sont de quatre ordres :

#### **Agronomiques**

#### Rendement

Baisse de 10 %\* tolérée

#### Qualité

Commercialisable pour les légumes, absence de tâches de maladies sur les pommes des choux fleurs

# Maîtrise des bioagresseurs

#### Maîtrise des adventices

O vivace et pas d'impact d'adventices sur la culture suivante, tolère la présence d'adventices en choux fleur mais pas en oignon

#### Maîtrise des maladies

O mildiou sur pommes de terre et oignons, tolère présence septoriose sur blé avec un seuil > seuil BSV

#### Maîtrise des ravageurs

Pas de dégâts de limaces sur blé et choux fleur, tolérance de pucerons sur pommes de terre et blé au-delà du seuil BSV, 0 chenille (piéride) et tolérance de quelques pucerons sur choux fleur

#### **Environnementaux**

#### **IFT** herbicide

Réduction de 50 %\*

## IFT total

Réduction de 50 %\*

#### Toxicité des produits

Utilisation des produits les moins toxiques lorsque le choix est possible pour un même effet.

## Socio-économiques

#### Marge brute

Accepte une baisse de 5 %\*

#### Temps de travail

Pour le désherbage manuel, maximum de 40 h/ha/an en choux fleur et 25 h/ha/an en oignon

L'objectif de réduction de 50 % des produits phytosanitaires est considéré comme une obligation de résultats : tous les leviers possibles ont été mobilisés sans aucune limitation. D'autres objectifs secondaires (économiques, rendement,...) ont été définis, l'objectif étant de voir quel serait l'impact d'une diminution de 50 % d'IFT sur ces autres indicateurs.

Les objectifs ont été définis à la **conception du système** pour la majorité d'entre eux. Cependant, au vu de l'expérience acquise, certains objectifs comme le **temps de travail manuel** ont été rajoutés en cours de route, et définis comme une obligation, afin d'assurer le caractère transposable des résultats à l'échelle d'une exploitation.

Les objectifs ont été définis à l'échelle du système de culture, et certains ont été déclinés par culture en tenant compte de leur valeur ajoutée et de leur niveau de maîtrise technique.



<sup>\*</sup> par rapport au système de référence 'IFT 100' testé sur le site

# Résultats sur les campagnes de 2013 à 2016

Le code couleur traduit le niveau de satisfaction des résultats vis-à-vis des objectifs initialement fixés à l'échelle des cultures puis à l'échelle du système dans son ensemble :

vert = résultat satisfaisant, orange = résultat moyennement satisfaisant, rouge = résultat insatisfaisant, blanc = absence d'objectif.

#### > Maîtrise des bioagresseurs



CIPAN : Culture Intermédiaire Piège à Nitrates ; CF : Choux Fleur ; Pdt : Pommes de terre

De manière générale, les résultats à l'échelle du système sont satisfaisants pour la gestion de tous les bioagresseurs. En cultures légumières il n'y a pas eu d'échec, ce qui était une crainte initiale au vu des contraintes de cette filière où toute une production peut être rejetée pour des défauts de qualité. Une bonne valorisation a été globalement obtenue. Certains résultats sont enthousiasmants comme pour la gestion des ravageurs en pommes de terre, où malgré un niveau de risque supérieur à celui recommandé dans le BSV, la régulation biologique a permis d'assurer une gestion satisfaisante des pucerons.

En début d'expérimentation, des **difficultés** ont été rencontrées et s'expliquent en partie par des **manques de technicité** dans le pilotage des cultures. Aujourd'hui **la maîtrise des adventices** en **oignons** reste problématique ainsi que la gestion des **chenilles en choux fleur de 2**ème **plantation** (CF2) pour lequel le créneau de plantation estival engendre une pression chenilles plus importante, nécessitant une forte réactivité pour leur gestion.

#### > Performances

> Performances													
	Agrono- miques		Environnementales					Economiques				Sociales	
	m	nde- ent 'ha)	I	FT*		T * picides	IFT * Fongicides	IFT *	bı	arge rute /ha)	Charges intrants (€/ha)	Charges mécanisa- tion (€/ha)	Temps travail (h/ha)
Choux Fleur 1	25.6	+6 %	0.0	-100 %	0.0	-100 %	0.3 0%	0.0 -100 %	7443	+7%	2532 -4 %	1027 -9%	194.7 -1%
Choux Fleur 2	26.9	-15 %	0.0	-100 %	0.0	-100 %	0.3 -90 %	5.4 -4%	8477	7 -16 %	1668 <i>-7%</i>	1455 <i>-1 %</i>	239.4 0%
Oignon (sauf 2016)	49.8	0 %	1.6	-44 %	1.6	-44 %	5.4 -38 %	0.7 0%	4047	7 -21 %	2145 <i>+58 %</i>	835 +17%	142.3 <i>+57 %</i>
Blé	7.7	-13 %	1.0	-45 %	1.0	-45 %	0.6 -66 %	0.0 -100 %	815	-8 %	383 -19%	291 -8%	4.7 -14 %
Choux Fleur	21.7	0 %	0.0	-100 %	0.0	-100 %	0.3 0%	1.6 -19 %	5916	+1 %	2190 <i>-2 %</i>	1478 +7%	234.8 +5 %
Pomme de terre	48.8	-2 %	1.4	-61 %	1.4	-61 %	12.2 -29 %	0.0 -100 %	3118	3 -13 %	2088 +7%	717 -2%	24.3 +14 %
Blé (sauf 2014 pour la réf.)	7.3	-10 %	1.0	-47 %	1.0	-47 %	0.6 -63 %	0.0 -100 %	745	-10 %	379 <i>-18</i> %	291 -3 %	4.6 -8 %
Système IFT 50		-5 %	0.7	-66 %	0.7	-66 %	2.7 -41 %	1.1 -22 %	4378	-11 %	1607 <i>0 %</i>	872 -2%	119.9 +3 %

<sup>\*:</sup> IFT calculé hors traitement de semences, hors produit de biocontrôle et sans distinction des cibles.

Légende : La valeur située à gauche correspond à la valeur moyenne de l'indicateur pour le système IFT 50 sur les quatre années. Le %, indiqué à droite, est exprimé par rapport au système de référence IFT 100 à partir des valeurs moyennes des 4 années.

Les performances du système, après 4 années d'expérimentation, sont **globalement satisfaisantes**. Les performances varient néanmoins selon les cultures. Seuls deux chiffres sont 'dans le rouge' : la marge brute pour le chou-fleur d'automne et l'oignon. Parmi les facteurs explicatifs, figurent des rendements plus faibles dans l'IFT 50 certaines années, mais aussi des charges d'intrants plus importantes (coût élevé de la variété résistante en oignon).







Le suivi de la vie du sol - L'activité biologique du sol (enzymes et diversité catabolique) et la densité microbienne (fumigation-extraction) ont été suivies pour chaque parcelle. L'indice d'humification a été significativement plus élevé dans les parcelles IFT 50 à partir de 2014. Toutefois ce constat doit être vérifié lors des prochaines années d'expérimentation. En effet, les effets potentiels du système sur la microflore du sol ne pourraient être réellement observés qu'après plusieurs rotations.

Le suivi des auxiliaires - Les données relatives aux populations d'auxiliaires et de ravageurs sont collectées de façon hebdomadaire sur les différentes cultures. En 2013, au vu de la présence importante d'auxiliaires, il a été décidé de ne pas intervenir sur les pucerons de la pomme de terre alors que le seuil 'BSV' était atteint. Une régulation naturelle a été réalisée par les auxiliaires.

Le suivi des résistances aux fongicides - Pour la septoriose du blé, l'évaluation de la résistance aux fongicides du champignon responsable de cette maladie (*Zymoseptoria tritici*) vis-à-vis de quatre matières actives (*epoxiconazole, boscalid, bixafen et fluxapyroxad*) a montré des niveaux de résistance élevés pour les quatre. Aucune différence significative entre les systèmes IFT 50 et IFT 100 n'a jusqu'ici été constatée pour ces résistances.

# Transfert en exploitations agricoles



Cette expérimentation confirme la **pertinence de leviers agronomiques** lorsqu'ils se trouvent **intégrés** dans un système de culture. Certaines combinaisons de leviers sont transférables en exploitation dès aujourd'hui, sans remettre en question les systèmes actuellement pratiqués dans la région.

On peut citer par exemple l'association :

- > Du décalage de la date de semis avec le choix variétal et l'effet de la rotation pour la gestion des maladies sur blé;
- > Du faux semis avec le désherbage mécanique pour la gestion des adventices sur pommes de terre;
- > Du choix variétal avec l'OAD Miléos® pour la gestion du mildiou sur pommes de terre et l'OAD Miloni pour la gestion du mildiou sur oignons.

Pour permettre le transfert de certains leviers, différentes conditions doivent être réunies :

- A l'échelle de l'exploitation, l'augmentation du nombre de cultures peut demander plus de maîtrise technique, plus d'investissements, un niveau de prise de risque plus élevé et plus de surface (allongement de la rotation);
- -A l'échelle du territoire, la capacité d'irrigation peut se poser pour les cultures légumières si elles venaient à être implantées sur des surfaces actuellement non irrigable;
- -A l'échelle des filières, une réflexion au niveau des débouchés serait nécessaire afin de permettre une 'dé-spécialisation' des producteurs.

# Pistes d'améliorations du système et perspectives



Des pistes d'améliorations techniques de ce système de culture ont été identifiées :

- > Au niveau de la rotation, en positionnant l'oignon après un blé pour une meilleure gestion des adventices ;
- > En améliorant la **gestion de l'interculture** : choix des espèces, conduite,.... ;
- > En anticipant les traitements en choux fleur pour assurer une meilleure gestion des chenilles ;
- > En utilisant des mélanges de variétés en blé pour la gestion des maladies ;
- > En amélioration le pilotage de l'irrigation;
- > En agroéquipement, en ayant recours à des innovations matérielles pour le désherbage mécanique en oignons (guidage caméra).



Des connaissances restent à développer au niveau de la recherche, par exemple pour les **produits de** biocontrôle sur oignon et blé, qui sont quasi inexistants à ce jour.

Pour en savoir +, consultez les fiches PROJET et les fiches SITE

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l'environnement, avec l'appui financier de l'Agence française pour la biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.








AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT Document réalisé par **Samuel ALLEXANDRE**, Chambre régionale d'agriculture des Hautsde-France



# Stratégie de gestion des maladies



Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l'expérimentation et permettant une réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce schéma. Il ne s'agit pas de la stratégie complète de gestion des maladies.



# Maladies cibles : Mildiou, fusariose, piétin, alenaria, botrytis

#### Objectifs:

- Blé : présence septoriose tolérée avec un seuil > seuil BSV, pas d'intervention sur fusariose et piétin
- Pommes de terre : 0 tolérance en mildiou, pas d'intervention sur alternaria et botrytis
- Choux fleurs et oignons : pas de tolérance de la présence de maladie

Leviers	Principes d'action	Enseignements		
Rotation	Allongement de la rotation, diversification et alternance cultures hiver et printemps	A permis de gérer l'hernie du choux fleur		
Date semis	Décalage date de semis après le 20 octobre pour le blé	A permis de supprimer les régulateurs de croissance sans avoir de verse		
	Oignon : variété résistante au mildiou	Combiné avec 1 à 2 traitements anti-botrytis/an, absence de mildiou mais coût élevé de la variété		
Variété résistante / tolérante	Blé : choix d'une variété qui a comme profil : rendement > 100 % des rendements témoins (réf. Arvalis) et qui a le meilleur profil de résistance maladies en rouille jaune, septoriose et fusariose	A permis de n'appliquer qu'un seul fongicide à ¾ de dose pendant 3 ans mais la résistance peut être vite contournée. Evolution : utiliser plutôt des mélanges de variétés		
	Pomme de terre : variété peu sensible au mildiou (note de sensibilité > 6), avec un profil commercialisable	A permis en moyenne de faire 2 à 3 traitements fongicides en moins		
OAD	Oignon : modèle Miloni pour évaluer le risque mildiou	Encore en construction (ne prend pas en compte l'irrigation). N'a permis de prévoir que la date de la 1 <sup>ère</sup> intervention avant mise en place de l'irrigation		
	Pomme de terre : modèle Miléos® pour évaluer le risque mildiou	Fonctionne bien. En 2015, a permis d'avoir 6 semaines sans traitements anti-mildiou. Besoin d'une station météo sur place		
Broyage des résidus	Broyage aussitôt récolte finie	Diminution du risque sclérotinia (hypothèse non mesurée)		

Variété d'oignon résistante au mildiou




A gauche, variété résistante Santero au mildiou, à droite variété sensible Hybelle utilisée en conventionnel. Photos 2016



# Stratégie de gestion des ravageurs



Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l'expérimentation et permettant une réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce schéma. Il ne s'agit pas de la stratégie complète de gestion des ravageurs.



# Ravageurs cibles:

Limaces, chenilles, gibiers, thrips, pucerons, mouches mineuses

#### Objectifs:

- Blé : pas de dégâts de limaces, tolérance de pucerons au-delà du seuil BSV
- Pommes de terre : tolérance de pucerons au-delà du seuil BSV
- Oignon : tolérance de mouches mineuses
- Choux fleur : pas de dégâts de limaces, tolérance d'aucune chenille (piérides) et tolérance de quelques pucerons

Leviers	Principes d'action	Enseignements
Rotation	Allongement de la rotation, diversification et alternance cultures hiver et printemps	A permis de gérer les nématodes en pommes de terre et choux fleurs
Date semis	Décalage date de semis après le 20 octobre pour le blé	A permis la suppression d'un insecticide à l'automne, sans causer de dégâts
Biocontrôle	Choux fleur: - Dipel contre les chenilles en systématique sur CF2, entre 0 et 1 fois pour CF1 et CF une plantation - Sluxx en préventif contre les limaces sous la bâche P17	<ul> <li>Dipel : temps d'action plus long qu'avec des produits conventionnels, besoin de plus anticiper le moment d'application et le stade (jeune chenille)</li> <li>Sluxx : bonne régulation des limaces</li> </ul>
	Blé: Sluxx dès apparition de limaces (sur observations avec suivi des seuils BSV)	Bonne gestion, pas d'écart observé par rapport au produit conventionnel
Bâche	Bâches P17 en CF1. Initialement utilisé pour protéger contre le froid mais sert aussi de barrière physique contre les insectes. Bâche enlevée à pommaison	A permis de ne faire aucun insecticide (contre 1 traitement en conventionnel)
Filet	Utilisation sur CF2 et CF une plantation. Rôle de barrière physique contre les insectes. Filet enlevé à pommaison	Utilisation d'un insecticide de biocontrôle en fin de cycle car risque chenilles important (températures élevées). Coût élevé du filet
Irrigation	Permet de lutter contre les thrips en oignon. Déclenchement de l'irrigation si présence de thrips (irrigation aussi si besoin d'eau)	A permis de gérer les thrips

Bâche P17 sur choux fleurs de printemps






# Stratégie de gestion des adventices



Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l'expérimentation et permettant une réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce schéma. Il ne s'agit pas de la stratégie complète de gestion des adventices.

Fuerianomonte



Duinning d'action

#### **Adventices cibles:**

Renouées liserons, laiterons, renouées persicaires, chardons, chénopodes

## **Objectifs:**

- 0 vivace
- Tolère la présence d'adventices en choux fleur
- 0 tolérance en oignon
- Pas d'impact d'adventices sur la culture suivante

Leviers	reincipes a action	Luseignements
Rotation	Allongement de la rotation, diversification et alternance cultures hiver et printemps	A permis de gérer facilement les graminées dans le blé. Oignon reste difficile à désherber. Evolution possible : positionner l'oignon après un blé et non après 2 choux fleurs
Date semis	Décalage date de semis après le 20 octobre pour le blé	A permis de faire 0 herbicide à l'automne, et d'appliquer l'herbicide à ½ dose en sortie d'hiver
Faux semis	Réalisation d'un faux semis suivi d'un deuxième selon la levée d'adventices et les conditions de portance du sol (en moyenne 1 faux semis avant pomme de terre, 2 avant choux fleur une plantation et 2 avant blé)	Avant choux-fleur une plantation : a bien fonctionné, car suffisamment de temps (15 mars au 15 mai – plantation choux-fleur) pour faire plusieurs faux-semis  Avant blé : vulpin ne lève qu'à partir du 1 <sup>er</sup> octobre, faux semis tardif mais efficace  Avant pomme de terre : a bien fonctionné, mais n'arrive à en faire qu'un seul
Biocontröle + Broyage	Belloukha pour défâner pommes de terre après broyage des fânes (condition d'application). Réalisation 3 semaines avant récolte	Résultat satisfaisant. L'utilisation nécessite des conditions d'application particulières (hygrométrie, ensoleillement,). Coût élevé du produit pour l'instant
Désherbage mécanique	Choux fleur : bineuse à moulinets, 2 passages selon levées et conditions du sol Pomme de terre : herse treffler, 2 passages selon levées et conditions du sol. Nécessite rebuttage	A fonctionné moyennement. Evolution : achat d'un matériel plus précis (guidage caméra)  A très bien fonctionné, 0 herbicide appliqué
	Oignon : binage lorsque oignon assez développé	Résultats non satisfaisants car adventices trop développées lors du premier passage et faible pouvoir couvrant des oignons
Désherbage thermique	Désherbage possible dès la levée des oignons	Résultats satisfaisants et bonne complémentarité avec le désherbage mécanique

Herse treffler sur pommes de terre (herse étrille avec des ressorts)





Louinno